

Lutte contre le Frelon asiatique à Saint-Agathon

Les organismes à vocation sanitaire (GDS France et FREDON France) viennent de publier un plan national de lutte contre le Frelon asiatique. Trois objectifs principaux y sont déclinés :

- un piégeage stratégique,
- la destruction des nids détectés,
- la protection des ruchers.

Afin de proposer un piégeage efficace et respectueux de l'environnement, plusieurs règles doivent être respectées :

- proscrire les pièges de type cloche, bouteille, VespaCatch avec un appât liquide accessible (ces pièges entraînent la mort de très nombreuses espèces de pollinisateurs). Les 3 types de pièges autorisés sont le piège japonais, le piège coréen à ailes et le piège à nasse (Néoppi ou Jabeprode).
 - piéger à proximité des secteurs très impactés
 - vérifier très régulièrement le contenu des pièges et les retirer dès que d'autres insectes sont capturés
- Le meilleur appât pour attirer le Frelon asiatique semble être l'alcool sucré (la bière particulièrement).

En 2023, la commune de Saint-Agathon a fait l'acquisition de plusieurs pièges Jabeprode afin de les distribuer aux apiculteurs du territoire. Des pièges de ce type (piège à sélection physique et dont la zone d'appât n'est pas accessible) sont disponibles cette année encore pour les personnes possédant des ruches ou habitant à proximité de ruchers. L'installation de pièges-bouteilles dans les jardins est déconseillée du fait des conséquences très néfastes sur les pollinisateurs sauvages.

La méthode la plus efficace pour diminuer les populations de Frelon asiatique reste la détection et la destruction des nids dès le début du printemps. Les nids primaires sont de petite taille (5 à 10 cm de diamètre) et comportent un orifice d'entrée à la base. Ils sont généralement situés à l'abri des intempéries : surveillez vos garages, abris de jardins, greniers, pergolas ou carports. Il est primordial de prévenir la mairie dès la détection d'un nid, afin de mieux connaître la répartition et l'évolution des populations de Frelon asiatique sur le territoire. A Saint-Agathon, 80 nids ont été détruits sur les 3 dernières années, dont la majorité étaient localisés dans les secteurs habités entre le bourg, Kerhollo et Kerjoly.

Le meilleur moyen de soutenir et de préserver l'abeille domestique et l'ensemble des pollinisateurs (abeilles sauvages, guêpes, mouches, papillons, coléoptères...) est de leur offrir des espaces de vie et de la ressource en abondance : tondre moins souvent pour laisser fleurir les plantes sauvages, préserver les haies existantes et replanter avec des essences locales, favoriser les prairies fleuries, ne surtout pas utiliser de pesticides.



Nid primaire de Frelon asiatique